

Az orvos – a rendelkezésre álló egészségügyi dokumentáció alapján – az alábbiak szerint tájékoztatja a beteget egészségi állapotáról, betegségéről, illetve ennek orvosi megítéléséről, valamint az esetlegesen korábbiakban elvégzett vizsgálatok, beavatkozások eredményéről (beleértve azok esetleges sikertelenségének, illetve a várttól eltérő eredménynek az okait is):

A fenti tájékoztatást követően az orvos az alábbi beavatkozás elvégzését javasolja:

## Császármetszés (sectio caesarea)

### 1. A beavatkozás szükségességének indokolása

A terhesség vagy a vajúdás során előállhat olyan helyzet, amely miatt a hüvelyi úton történő szülés nem biztonságos vagy nem lehetséges (pl. a terhesség során: harántfekvés; medencevégi hosszfekvés; anya nagyfokú rövidlátása nagy magzat, korábbi császármetszés társállapota, vajúdás során: rossz magzati szívhangok, elakadt szülés, méh túlfeszülése, vérzés). Császármetszés végzésére tehát orvosi javallat alapján kerül sor, melyről konziliáris orvoscsoport dönt. A műtétet magzati és/vagy anyai javallat alapján végezzük.

Az Ön esetében a beavatkozást az alábbi okok miatt javasoljuk:

### 2. A beavatkozás leírása

A beavatkozás során a terhes anyán végzett hasműtéttel világra segítjük a magzatot. Rövid előkészítés után a magzatot a műtét kezdetétől számított 5-10 percen belül emeljük ki, hogy a magzati, vagy anyai veszélyt a lehető leggyorsabban elháríthassuk. A műtétet gerinc (spinal), gerincközeli (PDA) érzéstelenítésben, vagy altatásban végezzük. A hasmetszés a szeméremdomb felett harántul futó, vagy hosszanti lehet. A metszés módjáról az operatőr dönt, lehetőség szerint az anya kérését is figyelembe véve. A műtét időtartama fél – egy óra. A műtét előtt állandó hólyagkatéter felhelyezésére kerül sor, amit 12 óra múlva eltávolítunk, valamint infúzió bekötése szükséges, gyógyszerek adása, és folyadékpótlás céljából. Műtét során általában hasfal zsírrétegébe néha vékony műanyag cső kerül bevezetésre, a sebváladék távozása céljából, amit műtét után 2-3. napon távolítanak el. A császármetszés során a magzat és az anya állapotának megítélése és a szövődmények elhárítása érdekében különböző vizsgálatokra, beavatkozásokra van szükség: szeméremszőrzet részleges, vagy teljes eltávolítása, a magzati szívhang és a méhvevényesség külső (a hasfalon történő) ellenőrzése, oxigén adása orron keresztül, szeméremtest és környékének fertőtlenítése, injekció, transzfúzió adása, gerinc közeli (peridurális) vagy gerinc (spinalis) fájdalomcsillapítás. Ezekon túl a szülő nő ill. a születendő magzat érdekében egyéb sürgősségi ellátás is szükségessé válhat.

### 3. A beavatkozás elmaradásának hátrányai, kockázatai

Életveszélyes állapot léphet fel Önnél és/vagy a gyermekénél. A beavatkozás elmaradása esetén, többszörösére nő az anyai és magzati betegségek kockázata, akár az anya és/vagy a magzat elvesztésének lehetősége.

### 4. A javasolt beavatkozástól várható eredmény

Egészséges baba születik, édesanya egészsége megóvható.

### 5. A beavatkozás általánosan ismert, jelentős szövődményei, mellékhatásai

Mint minden hasműtétnek, a császármetszésnek is lehetnek szövődményei:

- thrombózis (vérrögösödés), a vénák részleges vagy teljes elzáródása a végtagokban és a tüdőben mely esetenként a láb duzzadásával, fájdalommal. Esetenként maradandó fájdalommal, nehéz járással járhat.
- tüdőembólia, gyors érelzáródás mely nehézlégzéssel tüdőfelület kieséssel. Az elzáródott szakasz nagyságától függően, akár halállal is járhat.
- bélhűdés: A belek működésének leállása, has puffadást, emésztési zavart, okoz, ennek következményeként hasüregi gyulladást is léphet fel okozhat, súlyos esetben halált.
- hasüregi szervek sérülése: sérülhet a bél, főleg összenövések esetén véletlen szúrás, vágás által. Bélvarrat (sebészeti műtét válhat szükségessé, esetleges, részleges béleltávolítás, akár a bél hasfalra történő kivezetése is szükséges lehet. A hegnek későbbiekre kiható kozmetikai következményei lehetnek.
- utóvérzés, a méh izomzatának elernyedése melynek következménye a súlyos vérvesztés, szükséges lehet vér pótlására, újabb műtétre (általában méheltávolításra), leállhat a belső elválasztású mirigyek működése. A hormon termelésük csökkenhet a későbbiek folyamán. Az újabb beavatkozások késlekedése esetén (vér pótlás, újabb műtét akár halál is beállhat.
- hirtelen fellépő vérzés, melynek következtében a méh eltávolítása is szükségessé válhat.
- Felléphet műtét után lázas állapot, méh és méhkörüli gyulladás, mely jó esetben antibiotikus kezelésre gyógyul, de ritkán nagyobb beavatkozásra van szükség. A méh ürének kikaparására, vagy akár a gyulladt szerv eltávolítására. (méhkivétel) Természetesen ez nagyon ritkán fordul elő ezrelékekben mérhető.

A műtét szövődmények elhárítására a lehetőségek adottak, de a szövődmények kezelése átmenetileg meghosszabbíthatja a kórházi tartózkodást és átmenetileg nehezítheti az újszülött ellátását, szoptatását.

A többszöri műtét kozmetikai elváltozásokat, hegeket okozhat a hason és a hüvelyben, a gáton.

A dohányzás, túlzott alkoholfogyasztás, túlsúlyos testalkat általánosan megnövelheti a műtéti szövődmények és az altatás kockázatát - beleértve a tüdőgyulladást, sebfertőzést, vérrögök kialakulását a végtagokban illetve a tüdő érhalózatában - és végső esetben halálhoz is vezethet.

Az orvos tájékoztatja a beteget, hogy egyéni adottságai, egészségügyi állapota alapján fennáll-e bizonyos szövődmények, műtéti következmények kialakulásának az átlagostól eltérő, fokozott veszélye, valószínűsége, illetve kell-e, s amennyiben igen, milyen valószínűséggel kell számolni speciális szövődmények, műtéti következmények kialakulásával:

## 6. A lehetséges alternatív eljárások, módszerek és azok kockázatai

Nincs alternatív eljárás.

## 7. További ellátások, illetve a beavatkozást követő javasolt életmód

Szövődmény hiányában a műtétet követő 4. vagy 5. napon követően távozhat a kismama. Otthonában 6 hétig kímélő életmód, ülőfürdő kerülése, nemi élettől való tartózkodás és vitaminpótlás javasolt. A kórházból való távozást követően fellépő láz, bélműködési zavar, számottevő utóvérzés azonnali kontrollvizsgálatot igényel.

## 8. A beteg által adott tájékoztatás

Kérjük, aláhúzással válaszoljon az alábbi kérdésekre:

- |   |          |
|---|----------|
| ▲ Tud-e valamilyen gyógyszer iránti túlérzékenységről?<br>Ha igen, mely gyógyszerre?..... | Nem-Igen |
| ▲ Tud-e vérzékenységről?  | Nem-Igen |
| ▲ Van-e epilepsziája?   | Nem-Igen |
| ▲ Fennáll-e Önnél terhesség?  | Nem-Igen |
| ▲ Van-e zöldhályoga?  | Nem-Igen |
| ▲ Van-e beültetett szívritmus szabályozója?   | Nem-Igen |
| ▲ Van-e egyéb említésre méltó betegsége?<br>Ha igen, mi az?.....                          | Nem-Igen |
| ▲ Szed-e véralvadásgátló gyógyszert?<br>Ha igen, mi az?.....                              | Nem-Igen |

9. A beteg által feltett kérdések	Válaszok, illetve az orvos által közölni kívánt egyéb információk

**A jelen dokumentumban foglalt, valamint a döntési jogával kapcsolatos, külön dokumentumban foglalt tájékoztatás megértése és tudomásul vétele után a beteg a következőképpen nyilatkozik a javasolt beavatkozás elvégzésével kapcsolatban:**

Alulírott (név) \_\_\_\_\_, beteg / törvényes képviselő

jelen nyilatkozat aláírásával elismerem, hogy a javasolt beavatkozással kapcsolatos döntési jogommal, a fennálló betegséggel, annak kezelésével, illetve a javasolt beavatkozással, annak kockázataival, szövődményeivel, elmaradásának következményeivel, valamint a szóba jöhető alternatív kezelésekkkel kapcsolatban orvosaimtól teljes körű – írásbeli és egyéniesített szóbeli - tájékoztatást kaptam, melynek során lehetőségem volt kezelőorvosomnak kérdéseket feltenni és vele személyesen konzultálni. A részemre nyújtott tájékoztatást elegendőnek és teljes körűnek találtam. Elismerem, hogy tájékoztatást kaptam a beavatkozás során közreműködő személyek nevééről, szakképesítéséről és beosztásáról, valamint a javasolt beavatkozás tervezett időpontjáról is. Tudomásul veszem, hogy a beavatkozás után a vártnál rosszabb eredmény, akár negatív következmény is előállhat, illetve, hogy a szakszerű kezelés esetén is előfordulhatnak előre nem várható szövődmények, amelyek a várható gyógyeredményt (gyógytartamot) kedvezőtlenül befolyásolhatják. Tudomásul veszem továbbá, hogy a javasolt beavatkozás visszautasításának következményeiért kizárólag én vagyok a felelős, azokat az orvosokat, akiknek a kezelését nem fogadtam el, a felelősség alól felmentem.

**A részemre nyújtott írásbeli és egyéni szóbeli tájékoztatás alapján, bármiféle megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszerítéstől mentesen, jogaim megismerését követően, saját elhatározásomból úgy döntöttem, hogy a jelen tájékoztatásban megnevezett, javasolt beavatkozás elvégzésébe, illetve annak orvosilag indokolt, előre nem látható kiterjesztésébe**

**beleegyezem**

**nem egyezem bele, azt visszautasítom**

Kijelentem, hogy orvosaim elől semmilyen, a gyógykezelésem szempontjából lényeges körülményt nem hallgattam el, őt az általam ismert betegségeimről és allergiáimról, az általam szedett gyógyszerekről és gyógyszerérzékenységeimről a valóságnak megfelelően, teljes mértékben tájékoztattam.

\_\_\_\_\_  
Beteg / törvényes képviselő aláírása

\_\_\_\_\_  
Orvos aláírása

Szigetvár, 20..... év .....hónap .....nap.....óra.....perc.